

**DICTIONNAIRE
VIDAL**

1972

Indication :

Le D. T. Bis est réservé aux rappels de la vaccination D. T. chez l'adolescent et l'adulte. La première injection de rappel de la vaccination antidiphtérique et antitétanique doit avoir lieu 1 an après la primo-vaccination. Les injections de rappel ultérieures sont conseillées tous les 5 ans, en association avec le vaccin antipoliomyélitique.

Conservation :

Le D. T. Bis doit être conservé à + 4 C.

Présentation :

Ampoule-seringue de 1 ml.

Prix : 5,45 F.

Visa : NL 4.805.

INSTITUT MÉRIEUX

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2°).

D. T. COQ

Vaccin triple associé contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.

Composition :

Anatoxine diphtérique purifiée.
Anatoxine tétanique purifiée.
Bordetella Pertussis en phase 1.
Dose vaccinante sous un volume de 1 ml.

Indication :

Prophylaxie de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche.

Mode d'emploi :

Voie sous-cutanée.
Il est indispensable de bien agiter le vaccin avant l'emploi de façon à obtenir une bonne homogénéisation.

Rythme des injections :

- 3 injections de 1 ml à un mois d'intervalle.
- 1 injection de rappel de 1 ml est indispensable un an après la troisième injection.
- 1 injection de rappel de 1 ml est conseillée à la période pré-scolaire.

Contre-indications :

En plus des contre-indications habituelles à toute vaccination, il convient de ne vacciner qu'avec les plus grandes précautions du fait de la présence dans ce vaccin de l'antigène coquelucheux, les enfants présentant des antécédents d'ordre neurologique, ou d'ordre allergique qu'ils soient personnels, collatéraux, ou héréditaires.

Conservation :

Le vaccin doit être conservé à + 4° C.

Présentation et Prix :

Ampoule-seringue de 1 ml : F 4,25.

Remboursé par la Sécurité Sociale et agréé à l'usage des Collectivités.

Visa : 2.222 SV 1.487.

INSTITUT MÉRIEUX

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2°).

D. T. COQ ADSORBÉ

Vaccin triple associé contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.

Composition :

Anatoxine diphtérique purifiée.
Anatoxine tétanique purifiée.
Bordetella Pertussis en phase 1.
Hydroxyde d'aluminium.
Dose vaccinante sous un volume de 0,5 ml.

Indication :

Prophylaxie de la diphtérie, du tétanos et de la coqueluche.

Mode d'emploi :

Voie sous-cutanée profonde.
Il est indispensable de bien agiter le vaccin avant l'emploi de façon à obtenir une bonne homogénéisation.

Rythme des injections :

- 3 injections de 0,5 ml à un mois d'intervalle.
- 1 injection de rappel de 0,5 ml est indispensable un an après la troisième injection.
- 1 injection de rappel de 0,5 ml est conseillée à la période pré-scolaire.

Avantages du D. T. COQ ADSORBÉ

Le vaccin D. T. COQ ADSORBÉ par sa haute valeur antigénique suscite une meilleure réponse en anticorps et permet une immunisation précoce chez le jeune enfant.

Le faible volume de l'injection, réduit à 0,5 ml, facilite les interventions. On peut avantageusement associer aux injections de D. T. COQ ADSORBÉ la prise orale de vaccin antipoliomyélitique buvable, en réalisant ainsi la vaccination quadruple.

Contre-indications :

En plus des contre-indications habituelles à toute vaccination, il convient de ne vacciner qu'avec les plus grandes précautions, du fait de la présence dans ce vaccin de l'antigène coquelucheux, les enfants présentant des antécédents d'ordre neurologique, ou d'ordre allergique qu'ils soient personnels, collatéraux, ou héréditaires.

Conservation :

Le vaccin doit être conservé à + 4° C.

Présentation et Prix :

Ampoule-seringue de 0,5 ml : F 4,60.

Remboursé par la Sécurité Sociale et agréé à l'usage des Collectivités.

Visa : 2.222 SV 1.745.

INSTITUT MÉRIEUX

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2°).

D. T. POLIOT D.

Vaccin triple associé contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.

Composition :

Vaccin antipoliomyélique inactivé par le formol et la bêta-propiolactone.

Anatoxine diphtérique purifiée.

Anatoxine tétanique purifiée.

Dose vaccinante sous un volume de 1 ml pour les injections de primo-vaccination.

Dose vaccinante sous un volume de 1,5 ml pour l'injection de rappel.

Ce vaccin ne contient ni pénicilline ni streptomycine.

Indication :

Prophylaxie associée de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite.

Mode d'emploi :

Voie sous-cutanée.

Rythme des injections :

— 3 injections de 1 ml à un mois d'intervalle.

— 1 injection de rappel de 1,5 ml un an environ après la 3^e injection.

Contre-indications :

Ce sont celles communes à toutes les vaccinations. Avec ce vaccin triple elles sont très rares.

Conservation :

Le vaccin doit être conservé à + 4° C.

Présentations et Prix :

Ampoule-seringue de 1 ml : F 7,35.

Ampoule-seringue de 1,5 ml : F 10,35.

Remboursé par la Sécurité Sociale et agréé à l'usage des Collectivités.

Visa : NL 3.205.

INSTITUT MÉRIEUX

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2^e).

D. T. VAX

Vaccin double associé contre la diphtérie et le tétanos.

Composition :

Anatoxine diphtérique purifiée.

Anatoxine tétanique purifiée.

Dose vaccinante sous un volume de 1 ml.

Indication :

Prophylaxie de la diphtérie et du tétanos.

Mode d'emploi :

Voie sous-cutanée.

Rythme des injections :

— 3 injections de 1 ml à un mois d'intervalle.

— 1 injection de rappel de 1 ml est indispensable un an environ après la troisième injection.

— 1 injection de rappel de 1 ml est conseillée à la période pré-scolaire. Chez l'adolescent et chez l'adulte les rappels seront faits de préférence avec le D. T. Bis.

Contre-indications :

Ce sont celles communes à toutes les vaccinations. Avec ce vaccin elles sont très rares.

Conservation :

Le vaccin doit être conservé au frais.

Présentation et Prix :

1 ampoule-seringue de 1 ml : F 2,60.

Remboursé par la Sécurité Sociale et agréé à l'usage des Collectivités.

Visa : 2.222 SV 1.499.

INSTITUT MÉRIEUX

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2^e).

DT-POLIO S. P.

Vaccin associé antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélique.

Composition :

Anatoxine diphtérique..... 30 U. I.

Anatoxine tétanique..... 15 U. I.

Vaccin antipoliomyélique Lépine, 1,1 ml et rappel 1,6 ml.

Mode d'emploi :

La vaccination associée comporte 3 injections de 1,1 ml à un mois d'intervalle et une injection de rappel de 1,6 ml un an après.

Conservation à + 4° C.

Présentation et Prix :

Ampoule-seringue de 1,1 ml : F 7,80

Ampoule-seringue de 1,6 ml Rappel : F 10,85

Remboursé Sécurité Sociale. — Visa : 2.496.

Voir également Vaccin IPAD DTP.

INSTITUT PASTEUR

36, rue du D^r-Roux — PARIS (XV^e). — (Tél. : 566-58-00.)

Distributeur exclusif pour la France :

Laboratoire ROGER BELLON

(Tél. : 637-90-00.)

D. T. VAX ADSORBÉ

Vaccin double associé contre la diphtérie et le tétanos.

Composition :

Anatoxine diphtérique purifiée.

Anatoxine tétanique purifiée.

Hydroxyde d'aluminium.

Dose vaccinante sous un volume de 0,5 ml.

Indication :

Prophylaxie de la diphtérie et du tétanos.

Mode d'emploi :

Agiter l'ampoule avant l'emploi de façon à obtenir une bonne homogénéisation.

Voie sous-cutanée profonde.

Lorsqu'il s

Considérat
Dr Ducray
a les mêm
matière ac
spécifiques
sont nomb
- ils ont de
- ils ont un
- ils sont tr
- ils ont un
Il n'apparait
tous les cas
- ils ont une
- ils sont co

Après une é
en mesure d
de peau.

DERMO-PAIN

FORMULE :

Vitamine F.
Lanoline.
Complexe de
d'alkyle et d'alc
pH 6,5.

ACTION :

Non allergisan
Ne contient ni

Dictionnaire Vidal

1 ampoule...
par voie sous-cutanée p
comporte 3 injections
injection de 1 ml de ra

A conse

Présentation : Boîte de

plus grande pr

Visa :

INSTITU

36, rue du D^r-Roux — PA

Distributeur exc

Laboratoire

(Tél.)