

**DICTIONNAIRE  
VIDAL**

---

**1973**



**IX**®  
ting> des sécrétions  
tro-duodénales.

**osition**  
... six milligrammes  
: 1 comprimé sec  
illigrammes de  
thyl Hyoscine  
primés.)

**itions :**  
il, troubles des  
hernie hiatale.

**ologie**  
eux fois par jour.  
rebelle, porter la  
grammes par 24 heures  
des troubles : un  
demi-comprimé le  
des troubles : un  
un comprimé le

**ndications**  
le prostatique.  
DRIX peut entraîner  
chertesse de la bouche  
es de l'accommoda-  
nements.

ite de 30 comprimés

**F + SHP. A.**  
t Coll.

**L 5.054.**

Centre Européen de  
ERNAY n° 5440 M.

**boratoires**

— Tél. 735.

**PTAN**  
DL-R. 4749

**lectable.**  
uction rapide, spécif-  
gence psychiatrique.

**ule :**  
... 50 mg  
... Q. S. p. 10 mg

**stés :**

... 50 mg  
... Q. S. p. 10 mg

... 50 mg  
... Q. S. p. 10 mg

... 50 mg  
... Q. S. p. 10 mg

... 50 mg  
... Q. S. p. 10 mg

... 50 mg  
... Q. S. p. 10 mg

... 50 mg  
... Q. S. p. 10 mg

... : états aigus d'agitation psychomotrice d'ori-  
... (psychoses chroniques lorsque le syndrome  
... est prédominant) - urgence psychiatrique.

**ndication.** — Grossesse.

**Posologie :**  
... elle s'adapte à tous les types d'anes-  
... Elle dépend de l'âge du malade, de la nature  
... à durée de l'intervention, ainsi que des drogues  
... (Se référer à la plaquette de documentation.)  
... intra-musculaire ou intra-veineuse ou en

... : 1 à 1 ampoule, 3 à 4 fois par jour ; • à la  
... en injection intra-musculaire ou intra-

**Présentation et Prix.** — Flacon à prélèvements mul-  
... de 30 ml contenant 50 mg de DROPERIDOL.  
**F 7,55 + S. H. P.**

... la solution peut également être bue.  
Remboursé S. S., Art. 115, A. M. G.  
... aux Hôp. de Paris et aux Collect.

Tableau A.  
Visa : NL 2.519.

Laboratoire **LE BRUN**  
... - PARIS (XVI<sup>e</sup>). - (Tél. : 723-61-62 +.)

### DROPARGYL DROPARGYL BÉBÉ

(Gouttes nasales)

	DROPARGYL	DROPARGYL
		BÉBÉ
... 0,50 %	0,50 %	0,50 %
... 0,50 %	0,50 %	0,50 %
... 0,50 %	0,50 %	0,50 %

... à saturation dans une eau  
purifiée : Q. S. p. 100 ml.

**Antiseptique.** — Antiseptique puissant, sédatif des voies  
... Décongestionne rapidement la muqueuse nasale et  
... Vaso-constricteur sans action desséchante sur  
... Neutre, indolore, d'un emploi agréable.

**Rhino-pharyngites** aiguës et chroniques, grippe,  
... toutes affections du rhino-pharynx.

**Flacon compte-gouttes** spéciaux pour instil-  
... 2 à 5 gouttes dans chaque narine, 2 à 3 fois par jour.

**DROPARGYL** flacon 15 ml - 21.295 B 4.342.  
**DROPARGYL BÉBÉ** flacon de 10 ml - 21.295 B 5.985.  
... F 1.55. Remboursées par la Sécurité Sociale.

**DEPHEM**  
... - PARIS (XV<sup>e</sup>). - (Tél. : VAU-74-99.)

### D. T. BIS

Vaccin Antidiphtérique.

Antitétanique de rappel.

**Composition :**

... diphtérique purifiée ;

... vaccinante de rappel ;

... téanique purifiée ;

... vaccinante de rappel ;

... vaccinante de rappel sous un volume de 1 ml.

... vaccinante de rappel d'anatoxine diphté-  
... est une dose réduite de l'ordre de

... focalisées.  
... vaccinante de rappel d'anatoxine téanique  
... à la dose habituelle du vaccin

**Voie d'administration :**

... dans la fosse sous-épineuse

### D-THYROXINE

(D.T.)

**Indication :**  
Le D. T. Bis est réservé aux rappels de la vaccina-  
tion D. T. chez l'adolescent et l'adulte.

La première injection de rappel de la vaccination  
antidiphtérique et antitétanique doit avoir lieu

1 an après la primo-vaccination. Les injections  
de rappel ultérieures sont conseillées tous les

5 ans, en association avec le vaccin antipolio-  
myélitique.

**Observation :**

Le D. T. Bis peut utilement servir de solvant au  
RUDIVAX (vaccin lyophilisé contre la rubéole.)

**Conservation :**

Le D. T. Bis doit être conservé à + 4°C.)

**Présentation :**

Ampoule-seringue de 1 ml.

**Prix : 5,45 F.**

L'ampoule-seringue doit être obligatoirement  
détruite après utilisation.

Visa : NL 4.805.

**INSTITUT MÉRIEUX**

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2<sup>e</sup>).

### D. T. COQ ADSORBÉ

Vaccin triple associé contre la diphtérie,  
le tétanos et la coqueluche.

**Formule :**

Anatoxine diphtérique purifiée.

Anatoxine téanique purifiée.

Bordetella Pertussis en phase 1.

Hydroxyde d'aluminium.

Dose vaccinante sous un volume de 0,5 ml.

**Indication :**

Prophylaxie de la diphtérie, du tétanos et  
de la coqueluche.

**Mode d'emploi :**

Voie sous-cutanée profonde.

Il est indispensable de bien agiter le vaccin  
avant l'emploi de façon à obtenir une

bonne homogénéisation.

**Rythme des injections :**

— 3 injections de 0,5 ml à un mois d'in-  
tervalle.

— 1 injection de rappel de 0,5 ml est indis-  
pensable un an après la troisième injection.

— 1 injection de rappel de 0,5 ml est conseil-  
lée à la période pré-scolaire.

**Avantages du D. T. COQ ADSORBÉ**

Le vaccin D. T. COQ ADSORBÉ par sa  
haute valeur antigénique suscite une meil-  
leure réponse en anticorps et permet une

immunisation précoce chez le jeune enfant.

Suite →



(Suite)

Le faible volume de l'injection, réduit à 0,5 ml, facilite les interventions. On peut avantageusement associer aux injections de D. T. COQ ADSORBÉ la prise orale de vaccin antipoliomyélique buvable, en réalisant ainsi la vaccination quadruple.

**Contre-indications :**

En plus des contre-indications habituelles à toute vaccination, il convient de ne vacciner qu'avec les plus grandes précautions, du fait de la présence dans ce vaccin de l'antigène coquelucheux, les enfants présentant des antécédents d'ordre neurologique, ou d'ordre allergique qu'ils soient personnels, collatéraux ou héréditaires.

Les réactions sont en général peu importantes, surtout si l'on prend la précaution de préparer l'enfant : un suppositoire d'une association d'acide acétylsalicylique et de phénobarbital la veille, le jour et le lendemain de la vaccination.

**Conservation :**

Le vaccin doit être conservé à + 4° C.

**Présentation et Prix :**

Ampoule-seringue de 0,5 ml : **F 4,85.**

L'ampoule-seringue doit être obligatoirement détruite après utilisation.

Remboursé par la Sécurité Sociale

et agréé à l'usage des Collectivités.

Visa : 2.222 SV 1.745.

**INSTITUT MÉRIEUX**

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2<sup>e</sup>).

**D. T. POLIO**

**Vaccin triple associé contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.**

**Composition :**

Vaccin antipoliomyélique concentré inactivé par le formol et la bêta-propiolactone.

Anatoxine diphtérique purifiée.

Anatoxine tétanique purifiée.

Dose vaccinante sous un volume de 0,5 ml pour les injections de primo-vaccination et pour les rappels.

Ce vaccin ne contient ni pénicilline ni streptomycine.

**Indication :**

Prophylaxie associée de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite.

**Mode d'emploi :**

Voie sous-cutanée.

**Rythme des injections :**

— 3 injections de 0,5 ml à un mois d'intervalle.  
— 1 injection de rappel de 0,5 ml un an après la 3<sup>e</sup> injection, puis tous les 5 ans régulièrement.

**Contre-indications :**

Ce sont celles communes à toutes les vaccinations.

**Conservation :**

Le vaccin doit être conservé à + 4° C.

**Présentation et Prix :**

Ampoule-seringue de 0,5 ml : **F 9,90.**

L'ampoule-seringue doit être obligatoirement détruite après utilisation.

Remboursé par la Sécurité Sociale

et agréé à l'usage des Collectivités.

Visa : NL 3.205.

**INSTITUT MÉRIEUX**

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2<sup>e</sup>).

**D. T. VAX**

**Vaccin double associé contre la diphtérie et le tétanos.**

**Composition :**

Anatoxine diphtérique purifiée.

Anatoxine tétanique purifiée.

Dose vaccinante sous un volume de 1 ml.

**Indication :**

Prophylaxie de la diphtérie et du tétanos.

**Mode d'emploi :**

Voie sous-cutanée.

**Rythme des injections :**

— 3 injections de 1 ml à un mois d'intervalle.

— 1 injection de rappel de 1 ml est indispensable un an environ après la troisième injection.

— 1 injection de rappel de 1 ml est conseillée à la période pré-scolaire. Chez l'adolescent et chez l'adulte les rappels sont faits de préférence avec le D. T. Ba.

**Contre-indications :**

Ce sont celles communes à toutes les vaccinations.

**Conservation :**

Le vaccin doit être conservé au frais.

**Présentation et Prix :**

1 ampoule-seringue de 1 ml : **F 3,40.**

L'ampoule-seringue doit être obligatoirement détruite après utilisation.

Remboursé par la Sécurité Sociale

et agréé à l'usage des Collectivités.

Visa : 2.222 SV 1.499.

**INSTITUT MÉRIEUX**

17, rue Bourgelat — 69-LYON (2<sup>e</sup>).



**Rythme des injections :**  
Injections de 0,5 ml à un mois d'intervalle. Une injection de rappel de 0,5 ml un an après la 3<sup>e</sup> injection, puis tous les 5 ans.

**Contre-indications :**  
Maladies communes à toutes les vaccinations.

**Conservation :**  
Le vaccin doit être conservé à + 4° C.

**Présentation et Prix :**  
Ampoule-seringue de 0,5 ml : **F 9,90.**  
L'ampoule-seringue doit être obligatoirement détruite après utilisation.  
Remboursé par la Sécurité Sociale agréé à l'usage des Collectivités.  
Visa : NL 3.205.

**INSTITUT MÉRIEUX**  
rue Bourgelat — 69-LYON (2<sup>e</sup>).

**D. T. VAX**  
**Vaccin double associé**  
**contre la diphtérie et le tétanos.**

**Composition :**  
Toxine diphtérique purifiée.  
Toxine tétanique purifiée.  
Oxyde d'aluminium.  
Vaccinante sous un volume de 1 ml.

**Indication :**  
Prévention de la diphtérie et du tétanos.

**Mode d'emploi :**  
Injection sous-cutanée.

**Rythme des injections :**  
Injections de 1 ml à un mois d'intervalle. Une injection de rappel de 1 ml est indiquée un an environ après la troisième injection.

Une injection de rappel de 1 ml est conseillée à la période pré-scolaire. Chez l'adolescent et chez l'adulte les rappels seront de préférence avec le D. T. Bis.

**Contre-indications :**  
Maladies communes à toutes les vaccinations.

**Conservation :**  
Le vaccin doit être conservé au frais.

**Présentation et Prix :**  
Ampoule-seringue de 1 ml : **F 3,40.**  
L'ampoule-seringue doit être obligatoirement détruite après utilisation.  
Remboursé par la Sécurité Sociale agréé à l'usage des Collectivités.  
Visa : 2.222 SV 1.499.

**INSTITUT MÉRIEUX**  
rue Bourgelat — 69-LYON (2<sup>e</sup>).

**D. T. VAX ADSORBÉ**  
**Vaccin double associé**  
**contre la diphtérie et le tétanos.**

**Composition :**  
Toxine diphtérique purifiée.  
Toxine tétanique purifiée.  
Oxyde d'aluminium.  
Vaccinante sous un volume de 0,5 ml.

**Indication :**  
Prévention de la diphtérie et du tétanos.

**Mode d'emploi :**  
Agiter l'ampoule avant l'emploi de façon à obtenir une bonne homogénéisation.  
Injection sous-cutanée profonde.

**Rythme des injections :**  
Injections de 0,5 ml à un mois d'intervalle. Une injection de rappel de 0,5 ml est indiquée un an environ après la troisième injection.

Une injection de rappel de 0,5 ml est conseillée à la période pré-scolaire. Chez l'adolescent et chez l'adulte les rappels seront faits de préférence avec le D. T. Bis.

**Avantages du D. T. VAX ADSORBÉ :**

Le D. T. VAX ADSORBÉ, ayant une grande valeur immunisante, suscite une meilleure réponse en antitoxine et permet une vaccination précoce chez le jeune enfant.  
Le volume de l'injection, réduit à 0,5 ml, facilite les interventions.

**Contre-indications :**  
Maladies communes à toutes les vaccinations.

**Conservation :**  
Le vaccin doit être conservé au frais.

**Présentation et Prix :**  
Ampoule-seringue de 0,50 ml : **F 3,45.**

L'ampoule-seringue doit être obligatoirement détruite après utilisation.  
Remboursé par la Sécurité Sociale agréé à l'usage des Collectivités.  
Visa : 2.222 SV 1.746.

**INSTITUT MÉRIEUX**  
rue Bourgelat — 69-LYON (2<sup>e</sup>).

## D-THYROXINE

(Voir **DEBETROL**®)

**Laboratoire CHOAY**  
46, avenue Théophile-Gautier  
75782 PARIS CEDEX 16  
(Tél : 647-59-00.)

**DUCTON**  
**Thérapeutique immuno-stimulante**  
**par induction biologique**  
**des défenses naturelles contre l'agression.**

**Formule :**  
Lysat glyco-collé de la souche S 103 de *Neisseria Perflava* obtenue à partir de suspensions titrant 150 milliards de germes au millilitre ..... 5 ml  
Glycocolle ..... 1,50 g  
Éthylmercurithiosalicylate de sodium ..... 2,5 mg  
Eau distillée ..... Q. S. p. 100 ml

**Propriétés et Mode d'action :**  
La conception de DUCTON est basée sur les principes fondamentaux de l'immunothérapie non spécifique et sur le rôle prépondérant du terrain en pathologie.

Son activité pharmaco-biologique et clinique découle de l'intervention du lysat sur le système réticulo-endothélial dont le pouvoir phagocytaire est illimité, et sur les principaux mécanismes de défense non spécifique de l'organisme. Il a été, entre autres, prouvé que DUCTON :  
— stimule la fonction phagocytaire ;  
— augmente le taux du complément ;  
— améliore la réaction inflammatoire de défense ;  
— favorise la régénération et la cicatrisation.

**Indications :**  
Elles découlent des propriétés de DUCTON dont l'emploi est justiciable en face de toute agression, qu'elle soit de nature infectieuse, inflammatoire, tumorale, dégénérative ou médicamenteuse. L'étude clinique en médecine et en chirurgie, générale et spécialisée, a permis de dégager les indications préférentielles suivantes :

— **Pathologie infectieuse :** qu'elle soit d'origine microbienne ou virale.  
— **Cicatrisation :** au niveau d'affections cutanées diverses, telles que : plaies franches, brûlures, plaies atones, escarres, nécroses, ulcères variqueux, plaies trophiques, dermatoses et d'une manière générale, les retards de cicatrisation.  
**Ulcères gastro-duodénaux.**

**Ulcères gastro-duodénaux.**

Suite →